

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

〈口内炎用薬〉

口内炎・歯肉炎に

デンタルピルクリーム

第2類医薬品

- ◆口内炎、歯肉炎は口腔粘膜や歯肉に起る炎症で、ビタミンの欠乏、胃腸障害、細菌・ウイルス感染、歯石の沈着などによって起ります。
- ◆**デンタルピルクリーム**は、口腔粘膜や歯肉などの湿潤した創面の治療に適した緑色のクリームです。抗炎症作用のある合成副腎皮質ホルモン・プレドニゾロンと細菌感染を防ぐ殺菌剤・塩化セチルピリジニウムを効果的に配合していますので、口内炎、歯肉炎などに優れた効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6回使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

歯肉炎、歯齦炎、口内炎、口角炎、口唇炎

用法・用量


1日数回、適当量を清潔な指先、又は脱脂綿につけて、患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 本剤は効能・効果に記載されている症状にのみ使用し、眼科用その他に使用しないでください。

【チューブの穴の開け方】

キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。



成分・分量

(100 g 中)

成分	含量	はたらき
プレドニゾロン	0.2 g	患部の炎症をおさえます。
塩化セチルピリジニウム	0.1 g	患部を殺菌し、化膿を防ぎます。

添加物として、銅クロロフィリンナトリウム、ポリビニルピロリドン、ポリソルベート80、ゲル化炭化水素、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社

電話 0598-37-2088

受付時間 AM 10:00～PM 5:00
(ただし、土、日、祝祭日を除きます。)



発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元



万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142