

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

気になる傷あとなどを目立たなくする

外用薬
非ステロイド剤

トフラックスHPクリーム

第2類医薬品

トフラックスHPクリームの特徴

血行促進作用・抗炎症作用・保湿作用を持つ「ヘパリン類似物質」が、血流の循環を良くして、皮膚の再生を促進し、炎症による荒れた皮膚症状を鎮め、保湿作用により肌の防御機能を高めることで、気になる傷あとなどを改善していきます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
出血性血液疾患（血友病、血小板減少症、紫斑病など）の人
2. 次の部位には使用しないでください。
目や目の周囲、粘膜（口腔、鼻腔、陰など）



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4)湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
 - (1)使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

- (2)5～6日間使用しても症状が良くならない場合。

裏面もお読みください。

【効能・効果】

きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり（顔面を除く）、手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ（ただれを除く）、打身・ねんご後のはれ・筋肉痛・関節痛

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、またはガーゼなどにのばして貼ってください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用してください。

※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなることがあります)

※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。

- チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出して
 - チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。
- ください。(①→②)



折り曲げないでください。 折りたたまないでください。

【成分・分量】

100g中に次の成分を含みます。

成分	分量	はたらき
ヘパリン類似物質	0.3g	血行促進作用、抗炎症作用、保湿作用があります。

添加物としてセタノール、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油50、グリセリン、プロピレングリコール、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、エデト酸ナトリウム水和物、白色ワセリン、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、スクワラン、トリエタノールアミンを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)高温・直射日光をさけ、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

本品についてのお問い合わせはお買い求めのお店または下記にお願いいたします。

万協製薬株式会社

電話 0598-37-2088 受付時間 AM10:00～PM5:00(ただし、土、日、祝祭日を除きます。)

発売元

京都薬品ヘルスケア株式会社

京都市中京区西ノ京月輪町38番地

製造販売元



万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142