

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。また、必要時に読めるように保管してください。

皮ふ軟化薬

【無香料・無着色】

第3類医薬品

尿素20%+ビタミンE+グリチルリチン酸モノアンモニウム

90g

エフカイ®20α

◆乾燥してカサカサの手足やゴチゴチになったひじ・ひざ・かかと、ザラザラした肌は、皮ふ表面の角質層の水分不足が原因です。健康な皮ふは、適度の水分量を保っているため、皮ふが荒れることはないのですが、現代のエアコン等による除湿環境から、現在では年中皮ふの水分量が失われています。このような結果として、皮ふ表面の水分が失われると、皮ふが荒れてカサカサやゴチゴチの状態になります。お年寄りには皮ふの衰えから角質層の水分が失われやすく、また、水仕事が多い方も同様に水分が皮ふ表面から失われて肌が荒れやすくなります。

◆**エフカイ 20α** は、荒れた角質を軟らかくする「尿素」を20%配合し、さらに血流を改善する「ビタミンE」、荒れて炎症を起こした皮ふを治す「グリチルリチン酸モノアンモニウム」を配合したクリームで、硬い皮ふ、荒れた手、指、足をなめらかにします。

エフカイ 20α は、基剤にも保湿効果のあるスクワランを配合し、敏感肌の方にも使って頂けるよう無香料・無着色でさっぱりした使用感のクリーム剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂（ひび割れ）部位
- (3) かさぶたの様に皮ふがはがれているところ
- (4) 炎症部位（ただれ・赤く腫れているところ）



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師による治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 湿潤やただれのひどい人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感（痛み、熱感、ぴりぴり感）、かさぶたの様に皮ふがはがれる状態

- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 本剤のついた手で、目等の粘膜に触れないでください。
- (6) 化粧品ではないので、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

成分・分量 (1.0g中)

成分	含量	はたらき
尿素	200mg	角質層に水分を取り込み保持する作用により、皮ふにしっとり感を与えます。また、乾燥してカサカサになった角質層表面をなめらかにします。
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE)	5mg	末梢の血行を促して、皮ふ表面に十分な酸素・栄養素の供給が促進されます。皮ふ表面の新陳代謝が活発になり、すこやかな皮ふが生まれます。
グリチルリチン酸モノアンモニウム	5mg	患部の炎症を、修復しながら鎮めます。

添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、グリセリン、プロピレングリコール、パラベン、ステアリルアルコール、セタノール、パラフィン、流動パラフィン、カルボキシビニルポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、トリエタノールアミンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社

電話 0598-37-2088

受付時間 AM10:00~PM 5:00

(ただし、土、日、祝日を除きます。)

発売元 **東和製薬株式会社**

和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地

製造販売元 **万協製薬株式会社**

三重県多気郡多気町五桂1169-142